

Literatur zum Beitrag

Silke Filipovic, Silke Klarmann

Post-COVID – Therapiestrategie für die therapeutischen Gesundheitsfachberufe

1. Peters, S. 2022. Post-acute sequelae of COVID-19 six to 12 months after infection: population based study. BMJ; 379 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071050>
2. Koczulla, AR. 2022. S1-Leitlinie Long-/Post-COVID. Pneumologie; 12;76:855–907
3. Pink, I und Welte, T. 2022. Häufigkeit, Spektrum und Risikofaktoren von Long-COVID. Pneummo News;14(5):43–49. DOI: 10.1007/s15033-022-3407-y. E-pub 2022 Oct 20. PMID: 36281239; PMCID: PMC9581547
4. Strain, WD. 2022. „The Impact of COVID vaccination on symptoms of Long-COVID: An international survey of people with lived experience of Long-COVID“ Vaccines 10, no. 5: 652. <https://doi.org/10.3390/vaccines10050652>
5. Bundesärztekammer Bekanntmachung (23.9.2022). Post-COVID-Syndrom (PCS). Dt. Ärzteblatt. https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Medizin_und_Ethik/BAEK_Stellungnahme_Post-COVID-Syndrom_ONLINE.pdf (zuletzt aufgerufen am 15.3.2023)
6. Yong, SJ. 2021. Long-COVID or post-COVID-19 syndrome: putative pathophysiology, risk factors, and treatments. Infect Dis (Lond); 53(10): 737–754. doi: 10.1080/23744235.2021.1924397. epub 2021 May 22. PMID: 34024217; PMCID: PMC8146298
7. Monteil, V. 2020. Inhibition of SARS-CoV-2 infections in engineered human tissues using clinical-grade soluble human ACE2– DOI: 10.1016/j.cel.2020.04.004. https://www.cell.com/pb-assets/products/coronavirus/CELL_CELL-D-20-00739.pdf (zuletzt aufgerufen 15.3.2023)
8. Wölfel, R. 2020. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature 581, 465–469.
9. Durante, M. 2020. Single-cell analysis of olfactory neurogenesis and differentiation in adult humans. Nat Neurosci 23, 323–326. <https://doi.org/10.1038/s41593-020-0587-9>
10. Marongui, F. 2020. Pulmonary thrombosis in 2019-nCoV pneumonia? <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14818> (zuletzt aufgerufen am 15.3.2023)
11. Li, YC. 2020. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may play a role in the respiratory failure of COVID-19 patients. Onlinelibrary <https://doi.org/10.1002/jmv.25728> (zuletzt aufgerufen am 15.3.2023)
12. Mao, L. 2020. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan China. JAMA Neurol. 2020; 77(6): 683–690. doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127
13. Chickly, B. 2013. Reassessing cerebrospinal fluid (CFS) hydrodynamics: a literature review presenting a novel hypothesis for CFS physiology. Journal of Bodywork and Movement therapies 17:344–354
14. Hives, L. 2017. Can physical assessment techniques aid diagnosis in people with chronic fatigue syndrome myalgic-encephalomyelitis A diagnostic accuracy study.BMJ open 7: e017521
15. Blankenberg, S. 2021. Multi-organ assessment in mainly non-hospitalized individuals after SARS-CoV-2 infection. The Hamburg City Health Study COVID programme. European Heart Journal; 1–14, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/rehab914> (zuletzt aufgerufen am 8.4.2022)
16. KBV, Praxisnachrichten. 2023. Wirtschaftlichkeitsprüfung Heilmittel: Post-COVID-19-Syndrom ab 1. Juli besonderer Verordnungsbedarf. https://www.kbv.de/html/1150_52751.php (zuletzt aufgerufen am 14.3.2023)
17. Renz-Polster, H und Scheibenbogen, C. 2022. Post-COVID-Syndrom mit Fatigue und Belastungsintoleranz: Myalgische Enzephalomyelitis bzw. Chronisches Fatigue- Syndrom; . Innere Medizin; 63:830–839, <https://doi.org/10.1007/s00108-022-01369-x.https://europemc.org/b>
18. Singh, I. 2021. Persistent exertional intolerance after COVID-19: Insights from invasive cardiopulmonary exercise testing. CHEST. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.07.022>
19. Fühner, T. 2021. Stille Hypoxämie bei COVID-19: Eine Fallserie. Kompass Pneumol. DOI: 10.1159/000521461
20. Whitcroft, KL und Hummel, T. 2019. Clinical diagnosis and current management strategies for olfactory dysfunction: A Review. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 145: 846–853. doi:10.1001/jamaoto.2019.1728
21. Chamberlain, MSA. 2017. Physiotherapy, and speech and language therapy intervention for patients with refractory chronic cough: a multicentre randomised control trial. Thorax;72(2):129–136. doi: 10.1136/thoraxjnl-2016-208843. Epub 2016 Sep 28. PMID: 27682331
22. Rodriguez-Blanco, C. 2023. A 14-day therapeutic exercise telerehabilitation protocol of physiotherapy is effective in non-hospitalized post-COVID-19 conditions: a randomized controlled trial. J Clin Med;12(3):776. doi: 10.3390/jcm12030776. PMID: 36769425; PMCID: PMC9918076
23. Valverde-Martínez, MÁ. 2023. Telerehabilitation, a viable option in patients with persistent post-COVID syndrome: A systematic review. Healthcare (Basel);11(2):187. doi: 10.3390/healthcare11020187. PMID: 36673555; PMCID: PMC9859291